



laboratorium *rapport*

Uitslag, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: ontlasting

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
maagdarm-diagnostiek				
Parasieten ontlastingstest:				
moleculaire Biologie				
Protozoen i. Stuhl (Multiplex-PCR):				
Blastocystis hominis (PCR)**	negativ		.	negativ
Giardia lamblia (PCR)**	negativ		.	negativ
Dientamoeba fragilis (PCR)**	negativ		.	negativ
Entamoeba histolytica (PCR)**	negativ		.	negativ
Cyclospora cayetanensis (PCR)**	positiv		.	negativ
Cryptosporidium spp. (PCR)**	negativ		.	negativ

Maag-darm-diagnostiek - interpretatie van de uitslag

Cyclospora cayetanensis**

Het sporediertje **Cyclospora cayetanensis** komt wereldwijd voor. De enige bekende gastheer is de mens. Nadat de cystes in de ontlasting zijn uitgescheiden, rijpen de infectieuze stadia pas binnen 5-12 dagen, waardoor directe overdracht van persoon op persoon onwaarschijnlijk is. Infectie treedt meestal op door orale inname van oöcysten uit besmet voedsel of drinkwater.

Na 2-7 dagen treedt **intermitterende, waterige diarree** op (3-4x daags), die tot 9 weken kan aanhouden of bij mensen met een verzwakt immuunsysteem (bijv. AIDS) een chronisch verloop kan krijgen. Als gevolg van de vernietiging van het darmepitheel en het verlies van water- en elektrolyten kunnen daarnaast **bovenbuikklachten en moeheid** als verdere symptomen voorkomen.

Als preventieve maatregelen wordt het afkoken van drinkwater en het koken van fruit en groente aangeraden. Trimethoprim/Sulfamethoxazol kan therapeutisch gebruikt worden.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.